

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分10包  
31

呉茱萸湯「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠

2012年3月(記載要領変更に伴う改訂)  
2015年7月(様式改訂)

第2類医薬品

# 漢方薬 呉茱萸湯「タキザワ」

15G

## △ <使用上の注意>

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(しゃっくりに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【成分・分量】

ゴシュユ……………3.0g ニンジン……………2.0g  
ショウキョウ……………1.0g タイソウ……………4.0g  
1日分(1包5.0g×2) 10.0g

### 【効能・効果】

体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するもの次の諸症：頭痛、頭痛に伴うはきけ・嘔吐、しゃっくり

### 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診察を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



製造販売元  
株式会社 タキザワ漢方薬  
さいたま市見沼区片柳412-1  
お客様相談室 ☎048-688-7923  
受付時間:9時~18時(月~金)

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎0120-149-931



アルミ袋  
個包装