

第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。



# 漢方製剤 JPS 五積散料エキス錠N

五積散は比較的体力がなく、冷えがある方の胃腸炎、腰痛、神経痛、生理痛などを改善します。気のめぐりや血液の流れを良くし、冷えを除く働きがあります。

本剤は漢方処方である五積散の生薬を抽出し、乾燥エキスとした後、服用しやすい錠剤としました。

## 使用上の注意



### 相談すること

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。

排尿困難

(9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

**3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

### 〔効能・効果〕

体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるものの次の諸症：胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、更年期障害、感冒

## 〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15才以上）	4 錠	3 回
7 才以上15才未満	3 錠	
5 才以上7 才未満	2 錠	
5 才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)食間とは食後2～3時間を指します。

## 〔成分・分量〕

12錠中

五積散料乾燥エキス2.35gを含有しています。

日局ソウジュツ …………… 2.0 g	日局チ ン ピ …………… 1.0 g
日局ブクリョウ …………… 1.0 g	日局ハ ン ゲ …………… 1.0 g
日局ト ウ キ …………… 1.0 g	日局コウボク …………… 0.5 g
日局シャクヤク …………… 0.5 g	日局センキュウ …………… 0.5 g
日局ビ ャ ク シ …………… 0.5 g	日局キ ジ ツ …………… 0.5 g
日局キ キ ヨ ウ …………… 0.5 g	日局ケ イ ヒ …………… 0.5 g
日局マ オ ウ …………… 0.5 g	日局タ イ ソ ウ …………… 0.5 g
日局ショウキョウ …………… 0.5 g	日局カンゾウ …………… 0.5 g

上記生薬量に相当します

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。  
**ジェーピーエス製薬 お客様相談室**  
 電 話 045(593)2136  
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



**ジェーピーエス製薬株式会社**

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
 発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22