

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

五苓散 錠

(ごれいさん)

体内水分の調整に五苓散

すべて飲食物中の養分と水分は、胃腸の働きで消化吸収されて血液中に入り、血液循環にともなって組織中に運ばれ、養分は生命活動のエネルギーとなって分解し、そこでできた老廃物や過剰の水分は、腎臓の働きで「尿」として排出されて、血液の性状が適当となるよう迅速に調整されています。

ところが、胃腸の働きに故障があったり、胃下垂、胃腸カタル、二日酔いなどで水分が体内に停滞したり、排尿に異常が起こったりするとさまざまな症状が現れます。

五苓散（ごれいさん）は、このような水分代謝の異常をとともなう諸症状に古来用いられてきた漢方の薬方です。

- ◇ 初発時で熱のある場合にも、日数が経過して熱のない場合にも適応します。
- ◇ 口が渴いて、尿量が少ないもので水を飲みたがる場合にも、さほど水分を欲しない場合にも適応します。
- ◇ 水分の排泄障害があり、浮腫、吐き気、下痢などの症状や、胃に水分が多すぎて、グルグルとお腹が鳴ったり、足が腫れたり、手足が重くてだるいものにも適応します。

製品の特徴

本剤は、直径約7.4mmの黄褐色の素錠で、特有のにおいと味があります。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヶ月くらい（急性胃腸炎に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

のどが渇き、尿量少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ

注）「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことです。

用法・用量

大人は1回に8錠ずつ、1日3回食前または食間に、水または白湯にて服用してください。
小児用量は、

14歳以下7歳まで 1回5錠 6歳以下5歳まで 1回4錠

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本剤は大人1日の服用量24錠中に次の成分を含んでいます。

日局ケイヒ	0.55 g	日局ブクリョウ	0.85 g
日局チャレイ	0.85 g	日局タクシャ	1.40 g
日局ビャクジュツ	0.85 g		

保管および取り扱い上の注意

- (1) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2) 品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に、服用のつど、容器の口を十分にしめて保管してください。
- (3) 誤った用い方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

その他

- 本剤は生薬（薬用の草根木皮など）を原料とした薬ですので、製品により、錠剤の色調などが多少異なることがあります。効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存していて、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



長倉製薬株式会社

大阪市西成区聖天下 1-7-16

長倉の漢方薬