

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

テイヤク 五苓散 エキス顆粒

ゴレイサン

製品の特徴

テイヤク五苓散エキス顆粒は、漢方の古典「傷寒論」しょうかんろん「金匱要略」きんぎようりやくに記載されている漢方処方「五苓散」をエキス化し、服用しやすい顆粒剤にしたものです。

五苓散は、体力に関わらず服用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う場合の水様性下痢、暑気あたり、二日酔などに用いられます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位(急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたり)に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：

水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

<効能・効果に関連する注意>

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことです。

用法・用量

次の量を1日3回食前または食間に水またはお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15才以上）	1 包	3 回
15才未満 7 才以上	2/3 包	
7 才未満 4 才以上	1/2 包	
4 才未満 2 才以上	1/3 包	
2 才未満	1/4 包	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと 2 時間ぐらいたったところで服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1 才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量（3 包（6.0g）中）

五苓散水製乾燥エキス……………1.35g

〔タクシャ……………4.0g チョレイ……………2.4g プクリョウ……………2.4g〕
〔ビャクジュツ……………2.4g ケイヒ……………1.6g〕
添加物として、乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1 包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 本剤は、天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、製品により色が多少異なることがあります。効果が変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室 電話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00~17:00（土・日・祝日を除く）

販売元 **テイコクファルマケア**株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

発売元 **帝國製薬株式会社**

香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

帝國漢方製薬株式会社

徳島県阿波市土成町土成字北原80番11