

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



第2類医薬品

漢方製剤

サイリュンS<sup>®</sup>「コタロー」

さいこ かりゅうこつ ぼれいとう  
(柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠)

商品番号

S144

本剤は、漢方の古典「傷寒論」(後漢時代)記載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

現代はストレスの多い時代といわれますが、気苦労の多い仕事や環境等で心の緊張が続いたり、体は比較的丈夫なほうでもよく眠れない、落ち着かない、不安といった精神症状や、自律神経系を介して動悸、高血圧など、いろいろな症状があらわれやすくなるものです。

漢方では、精神的ストレスによって肝(今日でいう自律神経系)に乱れが生じ、心身に変調を来すと考えます。

サイリュンSは、疏肝作用といって、漢方でいう肝をリラックスさせる働きで、これらの症状を緩和する漢方薬です。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の医薬品を服用している人。

瀉下薬(下剤)

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位(小児夜なきに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる見えない場合

#### 3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

軟便、下痢

## 【効能・効果】

精神不安があって、どうき、不眠などを伴う次の諸症：  
高血圧の随伴症状（どうき、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜なき。

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

## ＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


## 【成分・分量】

成分・分量（本剤12錠中）		
サイコ……………2.50 g	ハンゲ……………2.00 g	ブクリョウ……………1.50 g
ケイヒ……………1.50 g	オウゴン……………1.25 g	タイソウ……………1.25 g
ニンジン……………1.25 g	リュウコツ……………1.25 g	ボレイ……………1.25 g
ショウキョウ……………0.50 g	ダイオウ……………0.50 g	
より抽出した水製エキス2.00 gを含有しています。		

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、合成ケイ酸アルミニウム、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒドロキシプロピルスターチ、ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カラメル、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。  
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (8) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



## 【包装】

180錠 540錠

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に

**小太郎漢方製薬株式会社**

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106