

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

第2類医薬品

漢方薬

ワクナガ 柴胡桂枝湯 エキス細粒

サイ コ ケイ シ トウ

製品の特徴

柴胡桂枝湯は、漢方の原典と言われる「傷寒論」^{しょうかんろん}「金匱要略」^{きんぎやうりやく}に収載されている漢方処方
で、腹痛を伴う胃腸炎や、微熱・寒気・頭痛・はき気などのある感冒、風邪の後期の症
状に用いられます。

ワクナガ柴胡桂枝湯エキス細粒は、柴胡桂枝湯をエキス化し、服用しやすい細粒にした
製品です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の
診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があら われる。
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。

- 1カ月位(かせの場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒気・頭痛・はき気などのある感冒、風邪の後期の
症状

用法・用量

1 回下記量を食前又は食間に水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人 (15才以上)	1 包	3 回
7才以上15才未満	2/3 包	
4才以上7才未満	1/2 包	
2才以上4才未満	1/3 包	
2才未満	服用させないで下さい	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間くらいたったところで服用して下さい。

<用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 (3包 (6.0g) 中)

柴胡桂枝湯水製エキス……………3.6g

サイコ……………2.5g	ハンゲ……………2.0g	ケイヒ……………1.25g
オウゴン……………1.0g	ニンジン……………1.0g	シャクヤク……………1.0g
タイソウ……………1.0g	ショウキョウ……………0.33g	カンソウ……………0.75g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、香料、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがあります。が、効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>