

ツムラの漢方内服液

微熱・さむけ・はき気

などのあるかぜ

かぜの中期～後期の症状、胃腸炎

柴胡桂枝湯

さいこけいしとう

第2類医薬品

体力中等度又はやや虚弱で、  
多くは腹痛を伴う方に



ツムラの漢方内服液

微熱・さむけ・はき気  
などのあるかぜ

かぜの中期～後期の症状、胃腸炎

柴胡桂枝湯

さいこけいしとう

第2類医薬品



ツムラ

30mL



# 第2類医薬品

## ⚠️【使用上の注意】

### 📖 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。むくみ(6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品(箱)を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 1ヵ月位(かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合。

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

【販売名】ツムラ漢方内服液柴胡桂枝湯

### 【用法・用量】

次の量を、食間に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

本剤は沈殿を含んでおりますので、服用前によく振ってから服用してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

本剤は1回1本の服用で飲みきり、のみ残しのないようにしてください。

### 【保管および取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

### 【効能・効果】

体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症:胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

### 【成分・分量】

本品1日量90mL(30mL×3本)中、以下の生薬より抽出した柴胡桂枝湯エキス5500mgを含有します。


日局サイコ……5.0g	日局シャクヤク……2.0g
日局ハンゲ……4.0g	日局タイソウ……2.0g
日局ケイヒ……2.0g	日局カンゾウ……1.5g
日局オウゴン……2.0g	日局ショウキョク……0.5g
日局ニンジン……2.0g	

添加物として日局安息香酸ナトリウム、日局エタノール、日局精製水、日局D-ソルビトール液、日局白糖、日局バラオキシ安息香酸ブチル、果糖ブドウ糖液糖を含有します。

副作用被害救済制度  
電話0120-149-931

捨てる際は、自治体で指定された方法で廃棄してください。

製造販売元 株式会社 廣 胃 堂  
富山市梅沢町2-9-1

発売元  株式会社 ツムラ  
東京都港区赤坂2-17-11  
〒107-8521

お客様相談窓口  
電話 0120-329-930  
<http://www.tsumura.co.jp/>