

漢方薬

この説明書は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品

水なしでのめる

小建中湯チュアブル

しょうじゅうとう

小建中湯は桂枝加芍薬湯に膠飴を加えた処方、体質の虚弱な小児や普段から冷えやすく、疲労しやすい人の改善薬として適しています。

本剤は水なしでのめるチュアブルタイプで、携帯に便利なスティック包装です。

⚠〔使用上の注意〕

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 悪心・嘔吐のある人
- (4) 高齢者
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人 むくみ
- (7) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まふたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

*〔効能・効果〕

体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症：

小児虚弱体質、小児夜尿症、夜泣き、慢性胃腸炎、神経質、腹痛、疲労倦怠




小児虚弱体質



小児夜尿症



夜泣き



慢性胃腸炎



神経質

〔用法・用量〕

次の量を食間あるいは空腹時に1粒ずつを口中に含み、かみ砕くか溶かして用いてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4粒	3回
15才未満7才以上	3粒	
7才未満5才以上	2粒	
5才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕

本品12粒中

桂枝加芍薬湯エキス……………2.2g

ケイヒ(桂皮)……………2.0g	ショウキョウ(生姜)……0.5g
シャクヤク(芍薬)……………3.0g	カンソウ(甘草)……………1.0g
タイソウ(大棗)……………2.0g	より製したエキス

膠 飴……………10.0g

添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、白糖を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5) スティック包装を開封後はすみやかに服用してください。なお、残りを使用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

〔お問い合わせ先〕

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL(052)883-5131 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

発売元

松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

松浦薬業株式会社
名古屋市緑区大高町寅新田36