

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名:新生小青竜湯2(鼻かぜ・鼻炎用)

第2類医薬品

△使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - 胃腸の弱い人
 - 発汗傾向の著しい人
 - 高齢者
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。

偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合
- 3.長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限(外箱及びピンラベルに記載)のすぎた商品は服用しないでください。(5)ピンをあげたら飲みきってください。(6)ピンをあげたまま保存しないでください。

発売元
クラシエ薬品株式会社

東京都港区海岸 3-20-20
ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間
10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269
副作用被害救済制度の問合せ先
☎0120-149-931

〈効 能〉

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症:
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

〈用法・用量〉

成人(15才以上)1回1本、1日2回朝夕、食前又は食間によく振ってから服用する。

15才未満は服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 本剤は、本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

〈成 分〉

成人1日の服用量90mL(45mL×2本)中
小青竜湯濃縮液……81mL
〔マオウ・シャクヤク・カンキョウ・カンゾウ・ケイヒ・サイシン・ゴミシ各3g、ハンゲ6gより抽出。〕

(小青竜湯濃縮液1mLは小青竜湯の混合生薬333.3mgに相当する。)

添加物として、安息香酸Na、パラベン、香料、バニリン、エチルバニリン、エタノール、白糖、ハチミツ、シヨ糖脂肪酸エステルを含有する。