


服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

しょう ふう さん  
**消 風 散（エキス顆粒）**

（漢方製剤）

 **使用上の注意**



**してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

**次の人は服用しないこと**

生後3ヵ月未満の乳児。



**相談すること**

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- （4）胃腸が弱く下痢しやすい人。

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

**3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

下痢

**4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

**5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

**効能・効果**

体力中等度以上の人皮膚疾患で、かゆみが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも

## 用法・用量

食間に水又はお湯にて服用

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人	1 包 (2g)	3 回
7歳以上15歳未満	成人の2/3量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/2量	
2歳以上 4歳未満	成人の1/3量	
2歳未満	成人の1/4量以下	

食間とは…  
食後2～3時間を  
指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

## 成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)2.0gを含有します。

ト ウ キ	1.5g	ジ オ ウ	1.5g
セ ッ コ ウ	1.5g	ボ ウ フ ウ	1.0g
ソ ウ ジ ュ ツ	1.0g	モ ク ツ ウ	1.0g
チ モ	0.75g	ク ジ ン	0.5g
ケ イ ガ イ	0.5g	カ ン ソ ウ	0.5g
ゴ ボ ウ シ	1.0g	ゴ マ	0.75g
セ ン タ イ	0.5g		

添加物として乳糖及びパレイシヨデンブンを含有します。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室  
電 話 03-3843-3833  
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう  
株式会社 **建林松鶴堂**  
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7