

漢方製剤

第2類医薬品

せいじょうぼうふうとう

清上防風湯エキス〔細粒〕85

本方は、「万病回春」の面病門（顔の病気）に出てくる処方で、顔面にうっ滞した熱を発散清解させる作用があるため、血気盛んな青年男女に多発する充血性のにきびに奏効します。

⚠️ • 使用上の注意 •

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸の弱い人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
*腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

*5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるものの次の諸症：

にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな（酒さ）

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

（食間とは食後2～3時間を指します。）

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
大人(15才以上)	1 包	2.0 g	3 回
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g	
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g	
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g	
2才未満	1/4包	0.5 g以下	

〔用法・用量に関連する注意〕

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

ケイガイ ……………0.75 g	センキュウ ……………1.5 g
オウレン ……………0.75 g	オウゴン ……………1.5 g
ハッカ ……………0.75 g	レンギョウ ……………1.5 g
キジツ ……………0.75 g	ピャクシ ……………1.5 g
カンゾウ ……………0.75 g	キキョウ ……………1.5 g
サンシシ ……………1.5 g	ポウフウ ……………1.5 g

上記より製した清上防風湯水製エキス6.3g(乾燥物換算で約2.84gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、結晶セルロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

(4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。

(5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21