

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

## 夜間頻尿 などの 悩みに

# ユリナール<sup>b</sup>

販売名: ユリナールb

漢方製剤 第2類医薬品

### 製品特徴

- 9つの生薬が硬くなった膀胱をやわらかくして、おしっこをためるなどの機能を改善する医薬品です
- 胃腸が弱い方にも服用いただけます
- 1日2回(朝・夕など)の食前又は食間に服用ください  
※食前とは、食事の約30分前のことをいいます  
※※食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

### 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
まれに下記の重篤な症状が起こることがある  
その場合は直ちに医師の診療を受けること
- | 症状の名称 | 症 状   |
|-------|---|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる                 |
3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症: 頻尿、残尿感、排尿痛、排尿困難、尿のにごり、こしけ(おりもの)

(裏面につづく)

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	5錠	1日2回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
  - (2)吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

## 成分・分量

1日量(10錠)中

清心蓮子飲エキス・・・2238mg

レンニク・・・・・・・・・・3.5g	バクモンドウ・・・・・・・・2.1g
ブクリョウ・・・・・・・・2.8g	ニンジン・・・・・・・・・・3.5g
シャゼンシ・・・・・・・・2.1g	オウゴン・・・・・・・・・・2.1g
オウギ・・・・・・・・・・2.8g	ジコッピ・・・・・・・・2.1g
カンゾウ・・・・・・・・0.7g	より抽出

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、セルロース、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、香料を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5)ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室  
**0120-5884-01**  
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

10211489 MADE IN JAPAN

2CD-\*\*\*S