

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ側面およびピンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

おしっこ^の悩みに **ユリナール[®]錠**

販売名:ユリナール J (清心蓮子飲エキス製剤) 漢方製剤 **第2類医薬品**

製品特徴

頻尿

目安として、昼間8回以上、
夜2回以上トイレに行く

残尿感

出した後、残る感じがして
スッキリしない

出しぶり

尿のキレが悪い
構えてもすぐに出ない
勢いが弱く、とぎれとぎれに出る

セイシレンシイン

ユリナール Jは、漢方処方「清心蓮子飲」に基づく製剤です
9種類の生薬からなる漢方処方が、頻尿や残尿感などの症状を徐々に緩和します
胃腸が弱く、全身に倦怠感があり、普段から口や舌が乾燥気味で、
尿が出しぶりがちな方に適しています



⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・ 息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、 これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる

- 1ヶ月くらい服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症：頻尿、残尿感、排尿痛、排尿困難、尿のにごり、こしけ(おりもの)

用法・用量

次の量を食前または食間に水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
15才未満	×	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
 - (2)吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量

1日量(12錠)中

清心蓮子飲乾燥エキスEX・・・2238mg

<原生薬換算量>

レンニク・・・・・・・・・・3.5g	バクモンドウ・・・・・・・・・・2.1g
ブクリョウ・・・・・・・・・・2.8g	ニンジン・・・・・・・・・・3.5g
シャゼンシ・・・・・・・・・・2.1g	オウゴン・・・・・・・・・・2.1g
オウギ・・・・・・・・・・2.8g	ジコッピ・・・・・・・・・・2.1g
カンゾウ・・・・・・・・・・0.7g	

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、セルロース、トウモロコシデンプン、乳糖、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、香料を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5)ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること
- (6)乾燥剤は服用しないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

株式会社バナケイア製薬

〒939-1275 富山県高岡市巾田4576番地

10118665 MADE IN JAPAN

4BE-12*6