

漢方薬

オオクサ 大甘丸

オオクサ 大甘丸(分包)

特徴

- 漢方薬「大甘丸」(だいかんがん)は、体力に関わらずご使用いただける緩和な下剤です。
- 「オオクサ大甘丸」は、ダイオウとカンゾウが理想とされる比率(ダイオウ:カンゾウ=2:1)で処方されており、お腹が痛くなりにくいのが特徴です。

⚠ 使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- (2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

効能

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常酵素・痔などの症状の緩和

<効能・効果に関する注意>

体力に関わらず、使用できます。



便秘



食欲不振



お腹の張り

用法・用量

次の量を就寝前及び朝食前に、水またはお湯でかますに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	20丸(1包)	2回
7歳以上15歳未満	13丸(約2/3包)	
4歳以上7歳未満	10丸(1/2包)	
4歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人の1日服用量40丸(2包)中

成 分	含 量
ダイオウ末(大黄末)	1960 mg
カンゾウ末(甘草末)	980 mg

添加物としてハチミツ、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。



お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：03(3370)7174(代表)

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

(独)医薬品医療機器総合機構
副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎1-17-15