

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

T-143B

第2類医薬品

だいおうぼたんびとう

大黄牡丹皮湯エキス顆粒KM

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1ヵ月位（便秘、痔疾に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能又は効果〕

体力中等度以上で、下腹部痛があって、便秘しがちなものの次の諸症：
月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾

〔用法及び用量〕

食間に服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	2.5 g	3回
小児 15歳未満 7歳以上	1.6 g（約2/3匙）	
7歳未満 4歳以上	1.2 g（約1/2匙）	

（用法及び用量に関連する注意）

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)本剤は、4歳未満の乳幼児に服用させないこと。

〔成分及び分量〕 1日量(7.5g)中

大黄牡丹皮湯水製乾燥エキス		4.00 g
〔日本薬局方	トウガシ	6.0 g〕
〔日本薬局方	トウニン	4.0 g〕
〔日本薬局方	ポタンピ	4.0 g〕
〔日本薬局方	ダイオウ	2.0 g〕
〔日本薬局方外	硫酸ナトリウム	4.0 g〕

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

- 本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10
電話：03-3973-2917
○受付時間：9:00～17:00
(土、日、祝祭日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931

発売元 **一元製薬株式会社**
東京都豊島区要町3-4-10
製造販売元 **株式会社 カ一ヤ**
(輸入元) 大阪府吹田市垂水町3-4-11