

開け口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

開け口

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。使用期限(パッケージ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

← チャック

販売名:ビスラット ゴールドb  
For Obesity and Constipation

漢方製剤 第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと: 他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること

**相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦または妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸が弱く下痢しやすい人(5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること: 下痢

4. 1ヶ月くらい(常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

**効能・効果** 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症: 肥満症、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、胃炎、神経症

**用法・用量** 次の量を食前または食間に水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	5錠	2回
15才未満	× 服用しないこと	

&lt;用法・用量に関連する注意&gt;

定められた用法・用量を厳守すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

**成分・分量** 1日量(10錠)中 大柴胡湯エキス(1/2量)・・・2.0g

<原生薬換算量> [サイコ 3.0g、ハンゲ 2.0g、ショウキョウ 0.5g、オウゴン 1.5g、シャクヤク 1.5g、タイソウ 1.5g、キジツ 1.0g、ダイオウ 0.5g]

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプンを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

**保管および取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにチャックをしっかりとめて保管すること(2)小児の手の届かないところに保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

(上段)使用期限(西暦年.月)/(下段)製造番号

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

MADE IN JAPAN