

体質研究から
生まれた

医薬品

体質研究から生まれた

和漢

わかんせん

箋

®

『和漢箋®(わかんせん)』は、

体の内部機能に着目した

漢方薬シリーズです。

お客様安心サポートデスク

お気軽にご相談ください。

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00

(土、日、祝日を除く)

詳しい情報はHPで!

www.

wakansen.com

がまんできな
い、ガサガサな
乾燥肌のかゆみに効く



第2類医薬品

〈販売名〉ロート当帰飲子錠 a

和漢

わかんせん

箋

®

冷え症で、

皮膚が乾燥する方の…

✓ つらいかゆみ

✓ 乾燥性の湿疹、皮膚炎

ロート製薬

この外箱は、本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

【効能・効果】 体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するものの次の諸症：湿疹・皮膚炎（分泌物の少ないもの）、かゆみ

 **使用上の注意**

 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【用法・用量】 次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。

成人(15才以上)…1回4錠、7才以上15才未満…1回3錠、5才以上7才未満…1回2錠、5才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2～3時間を指す。

【用法・用量に関連する注意】 (1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 12錠中 当帰飲子エキス3200mg(トウキ2.5g、シャクヤク1.5g、センキュウ1.5g、シツリシ1.5g、ポウフウ1.5g、ジオウ2.0g、ケイガイ0.75g、オウギ0.75g、カシュウ1.0g、カンゾウ0.5gより抽出)を含む。

添加物として、CMC-Na、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含む。

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取り扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

製造販売元： **オート製薬株式会社**

大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク：06-6758-1230

知っておきたい
商品特長

- 乾燥性皮膚疾患などによる、つらいかゆみを抑える効果があります。
- 乾燥したタイプの湿疹や皮膚炎、老人性乾皮症のかゆみにご使用いただけます。
- エキスの抽出方法にこだわっています。

副作用被害救済制度の問合せ先
0120-149-931