

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

トゴシュウ

(当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス製剤)

第2類医薬品

特 徴

トゴシュウは、当帰四逆加呉茱萸生姜湯（とうきしぎやくかごしゅゆしょうきょうとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、あまり体力がない人で手や足の冷えがひどく、しもやけのしやすい体質の人に適しています。血液循環をよくして、内から体を温め、体内に停滞している水分の代謝を促進し、頭痛、下腹部の痛み、腰痛、下痢、月経痛に効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状がある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：
冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します)

| 年 齢 | 1 回 量 | 1 日服用回数 |
|-----------|-----------------|---------|
| 成人（15歳以上） | 1包 | 3 回 |
| 15歳未満7歳以上 | $\frac{2}{3}$ 包 | |
| 7歳未満4歳以上 | $\frac{1}{2}$ 包 | |

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

本剤3包（1包3.0g）中に、次の生薬から抽出された当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス4.6gが含まれています。

| | | | |
|-----------|----|------------|----|
| トウキ（当帰） | 3g | カンゾウ（甘草） | 2g |
| ケイヒ（桂皮） | 3g | タイソウ（大棗） | 5g |
| シャクヤク（芍薬） | 3g | ゴシュユ（呉茱萸） | 2g |
| モクツウ（木通） | 3g | ショウキョウ（生姜） | 1g |
| サイシン（細辛） | 2g | | |

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
電話（06）6629-9058
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2