

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

41

錠剤

とう き し ぎゃく か ご しょうきょう とう
当帰四逆加呉生姜湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)胃腸の弱い人。
- (4)高齢者。
- (5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。

むくみ

- (7)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛 があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：
冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛

〔用法・用量〕

食前1時間に服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	6～8錠	3回

〔成分・分量〕（本品100錠中）

				自社製別紙規格			
日局	トウキ末	3.0 g	日局	トウキ	3.3 g	別紙規格逆加算（水性工キス） 3.0 g	
日局	ケイヒ末	3.0 g	日局	ケイヒ	3.3 g		
日局	シャクヤク末	3.0 g	日局	シャクヤク	3.3 g		
日局	カンゾウ末	1.9 g	日局	モクツウ	3.3 g		
日局	ショウキョウ末	4.1 g	日局	サイシン	2.3 g		
別紙規格	モクツウ末	3.0 g	日局	カンゾウ	2.3 g		
別紙規格	サイシン末	1.9 g	日局	タイソウ	5.5 g		
別紙規格	タイソウ末	5.2 g	日局	ゴシュユ	2.3 g		
別紙規格	ゴシュユ末	1.9 g	日局	ショウキョウ	4.4 g		

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10