

第2類医薬品

ご使用に際してはこの説明書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

◆角野の漢方製剤

角野血の薬

角野血の薬は漢方処方に従って、生薬を配合して製した煎剤で、特異な芳香があります。



〈使用上の注意〉



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談して下さい。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 胃腸の弱い人。
 - 3) 今までに薬により発疹、発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1カ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすくときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症。

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ

用法・用量

大人（15才以上）は本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mlを加えて、半量ぐらゐまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて、1日に3回食前に服用する。なお、小児用量（15才未満7才以上）は大人用量を1とするとき2/3包とする。

服用に際して、次のことに注意すること

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品 1日量（1包） 22.0g中

トウキ	3.0g
センキュウ	3.0g
シャクヤク	4.0g
ブクリョウ	4.0g
ビャクジュツ	4.0g
タクシャ	4.0g

保管及び取り扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない（湿気の少ない）涼しいところに（密栓して）保管すること。
- 2) 小児の手の届かないところに保管すること。

お問い合わせ先

本製品に対するお問い合わせは、下記をお願いします。

有限会社 角野製薬所 Tel. 0994-58-7978

受付時間 月曜日を除く午後1時から6時まで

製造販売元 有限会社 角野製薬所

〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名5756

角野血の薬

第2類医薬品

製造販売元

有限会社

角野製薬所

鹿児島県鹿屋市吾平町上名五七五六

電話（〇九九四）五八一七九七八

成分および分量または本質

1包22g中	トウキ	3.0g
	センキュウ	3.0g
	シャクヤク	4.0g
	ブクリョウ	4.0g
	ビャクジュツ	4.0g
	タクシャ	4.0g

用法および用量

大人(15才以上) 1日1包

1包に水約500ml(約2.75合)を加え、半量ぐらいまで煮つめ、せん液の滓をこして取り去り、食前3回に分服する。なお、小児用量(15才未満7才以上)は大人用量を1とするとき、2/3とする。

効能又は効果

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛・頭重・めまい・肩こり・耳鳴り・動悸などを訴える次の諸症。

月経不順・月経異常・月経痛・更年期障害・産前産後あるいは流産による障害(貧血・疲労・倦怠・めまい・むくみ)めまい・頭重・肩こり・腰痛・足腰の冷え症・しもやけ・むくみ・しみ

注意

- 1.服用に際しては、説明文をよく読むこと。
- 2.直射日光の当たらない涼しいところに保管すること。

10包 ¥3,150(税込) LOT

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931