

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

効能・効果

体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：四十肩、五十肩、肩こり、寝ちがえ

成分・分量 1日量(12錠)中
独活葛根湯エキス 2860mg

カクコン 2.5g、ケイヒ 1.5g、
シャクヤク 1.5g、マオウ 1.0g、
ドクカツ 1.0g、ショウキョウ 0.5g、
ジオウ 2.0g、タイソウ 0.5g、
カンゾウ 0.5g より抽出

添加物として、二酸化ケイ素、
CMC-Ca、タルク、ステアリン酸
Mg、セルロースを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとめて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと

販売名：シジラック
Medicine for Frozen Shoulder

押して開ける

第2類医薬品

漢方製剤

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸が弱く下痢しやすい人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人：排尿困難(9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

用法・用量

大人(15才以上)1回4錠、7才以上15才未満1回3錠、5才以上7才未満1回2錠、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(5才未満は服用しないこと)

〈用法・用量に関連する注意〉(1)定められた用法・用量を厳守すること(2)吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること(3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

紙 10201615

MADE IN JAPAN

税 控除 対象

あったらいいな
をカタチにする
小林製薬

四十肩、五十肩とは…

肩関節周囲炎などと呼ばれ、怪我などの外傷性誘因がなく肩関節が痛くて、腕が上がらないなどの肩の可動域が制限される疾患です

〈主な症状〉

- 腕を上げたり、回した時に動かしにくいなどの違和感がある
- 肩関節などに痛みがあり、腕が上がらない
- 寒冷時、夜間に痛みが強い

特徴

- 痛くてつらい四十肩、五十肩を体の中から飲んで治す漢方薬です
- 四十肩、五十肩にともなう肩関節の炎症を鎮めます

副作用被害救済制度
☎0120-149-931