

# 排膿湯

(はいのうとう)

第2類医薬品

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に収載されている排膿湯に準拠して製造された煎薬用の紙パック剤です。



相談すること



## - 使用上の注意 -

### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。 : むくみ  
(6) 次の診断を受けた人。 : 高血圧、心臓病、腎臓病

### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 脳	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5~6日間服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

### 3. 長期連用する場合は、医師又は薬剤師に相談すること

4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

## [効能・効果]

化膿性皮膚疾患の初期または軽いもの。

## [用法・用量]

1包(1日量)につき水400mLを加えあまり強くない火にかけ200mLに煮つめ、紙袋とともに煎じかすを取り去り、食前1時間前又は食間空腹時に温服して下さい。

年 齢	1包(1日量)	1 日 服用回数	年 齢	1包(1日量)	1 日 服用回数
大人(15才以上)	全 量	3回~2回 に分けて	15才未満7才以上 7才未満4才以上	2/3量 1/2量	3 回に 分けて

## <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。  
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## [成分・分量]

[本品1包(1日量) 15.0g 中]

日本薬局方 カンゾウ…3.0g 日本薬局方 ショウキョウ…1.0g  
日本薬局方 キキョウ…5.0g 日本薬局方 タイソウ…6.0g

## [保管及び取扱い上の注意]

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。  
(2) 直射日光を避け、なるべく温氣の少ない涼しい所に保管すること。  
(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。  
(4) 煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。

## [販売元]

東洋漢方製薬株式会社 フリーダイヤル 0120-00-1040

受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

● 東洋漢方製薬株式会社

大阪府富田林市中野町東2-1-16