

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

(1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

漢方
兆
きざしシークズ

老人性腰痛 精力減退



1日75粒 20日分

1500粒

サーミン八味丸

地黄・茯苓・山薬・桂皮・山茱萸
牡丹皮・沢瀉・附子



奈良大和生薬



販売名: サーミン八味丸 第2類医薬品

成分・分量 (大人1日服用量75粒中)

成分	分量	成分	分量
ジオウ末	2,000mg	ブクリョウ末	800mg
サンヤク末	1,000mg	ボタンピ末	800mg
サンシュユ末	1,000mg	ケイヒ末	300mg
タクシャ末	800mg	ブシ末	200mg

添加物としてハチミツ、寒梅粉、デヒドロ酢酸ナトリウムを含有する。

効能・効果

つかれやすい人で下腹部が軟弱で腰に冷痛あり、尿利減少又は頻数で全身疲労、倦怠感が強く、四肢が冷えやすいが時には熱感あり、腰痛があつて咽喉がかわく人。

●糖尿病 ●精力減退 ●動脈硬化症 ●神経痛 ●浮腫
●老人性腰痛 ●更年期障害 ●腎臓病

用法・用量

次の量を1日3回食間に白湯又は清水で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	25粒	3回
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法、用量を厳守してください。
- (2) 15才未満の方には服用させないでください。

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。保管環境によっては丸剤が付着したり、極稀にハチミツが白くうきあがる場合がありますが、品質には問題ありませんので、安心して服用してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 誤用の原因になったり品質が悪化することがありますので、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 本製品は自然の生薬を原材料として使用致しております。そのため、製品(ロット)によって丸剤の色調に多少の違いが生じることがありますが、品質には全く問題ありませんので安心して服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 **株式会社奈良大和生薬**
 医薬品相談窓口 受付時間 9:00~18:00(年中無休)
 ☎0120-005-189

発売元 **株式会社奈良大和生薬**
 奈良県奈良市二条大路南1-2-11

製造販売元 **全国薬品工業株式会社**
 奈良県橿原市今井町2-1-2

使用期限

製造番号



本体:PP フタ:PE
 スプーン:PP
 袋:PE