

漢方薬  
八味地黄丸  
ユリガードG

第2類医薬品

540錠

YURIGARD G

漢方薬  
八味地黄丸  
ユリガードG

夜間の頻尿

✓頻尿 ✓残尿感

✓軽い尿もれ

✓排尿困難

✓高齢者のかすみ目

✓高血圧に伴う  
肩こり、頭重、耳鳴り



第2類医薬品

540錠

ご使用に際して、  
外箱の説明文を  
必ずお読みくだ  
さい。また、必要  
な時に請めるよ  
うに大切に保管  
してください。

押してあける

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ぬれた手で錠剤に触れないでください。
- (5)吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをしっかりとしめてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 **薬王** 薬王製薬株式会社  
奈良県磯城郡田原本町245番地

お問い合わせ先 薬王製薬 お客様相談室  
電話 0744-33-8855  
受付時間 9:00~17:00(土日、祝日を除く)

使用期限 製造番号



紙箱

詰め物

販売名  
ユリガードG

第2類医薬品

540錠(30日分)

▲使用上の注意

※してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください。

- (1)胃腸の弱い人。(2)下痢しやすい人。

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。  
(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：  
頻尿、夜間尿、残尿感、軽い尿漏れ、排尿困難、むくみ、下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)

用法・用量

次の量を、食前又は食間に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	6錠	1日3回
7歳以上15歳未満	4錠	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)食間とは食後2~3時間を指します。

成分・分量 (1日量:18錠中)

八味地黄丸エキス(11/20量)…2.42g  
[ジオウ2.75g、サンシュユ・サンヤク・タクシャ・ブクリョウ・ボタンピ各1.65g、ケイヒ・フシ末各0.55gより抽出]

添加物として、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、ステアリン酸を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931