

漢方薬

はち み じ おう がん  
八 味 地 黄 丸

〔販売名〕峰寿丸

## ⚠ 【使用上の注意】

## ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
次の人は服用しないで下さい。

- (1) 胃腸の弱い人。
- 
- (2) 下痢しやすい人。



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 【成分・分量】 本品1日量(21丸)中

「日局」ジオウ……………896mg	「日局」ブクリョウ……………336mg
「日局」サンシュユ……………448mg	「日局」ボタンピ……………336mg
「日局」サンヤク……………448mg	「日局」ケイヒ……………112mg
「日局」タクシャ……………336mg	「日局」ブシ末……………112mg

なお、添加物として寒梅粉、コムギ、コメ、ハチミツ、白色セラックを含みます。

## 【効能・効果】 体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渴があるものの次の諸症：

下腹痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。  
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	7丸	3回
15歳未満	服用しないで下さい	

※用法・用量を厳守して下さい。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出るがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。
- 本剤は蜂蜜を用いて丸剤としていますので、丸剤どうしがくっつくことがあります。効果には変わりはありません。  
なお、くっついた場合には、容器の下を軽くたたいていただければ離れます。

【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室  
〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号  
電話：03(3807)3780  
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

発売元

伸和製薬株式会社  
東京都荒川区南千住5丁目17番8号

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社  
奈良県大和高田市根成柿574番地