



第2類医薬品

漢方煎専科

半夏厚朴湯

16

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして  
株式会社 タキザワ漢方廠

## 漢方薬 半夏厚朴湯 「タキザワ」

16E

## △＜使用上の注意＞

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児

## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(つわりに服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【成分・分量】

ハンゲ.....6.0g ソヨウ.....2.0g  
ブクリョウ.....5.0g ショウキョウ.....1.0g  
コウボク.....3.0g

1日分(1包8.5g×2) 17.0g

## 【効能・効果】

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

## 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方薬

さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1

お客様相談室 ☎048-688-7923

受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\_camp/index.html

☎0120-149-931



4 974961 180414