

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

T-158B

第2類医薬品

びゃっ こ か けい し とう

白虎加桂枝湯エキス顆粒KM

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4)胃腸虚弱で冷え症の人。
 - (5)高齢者。
 - (6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (7)次の症状のある人。
むくみ
 - (8)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のたるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能又は効果〕

体力中等度以上で、熱感、口渇、のぼせがあるものの次の諸症：のどの湯き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

〔用法及び用量〕

食前又は食間に服用する。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人 (15歳以上)	3.0 g	3 回
小児 15歳未満 7 歳以上	2.0 g (約2/3匙)	
7 歳未満 4 歳以上	1.5 g (約1/2匙)	
4 歳未満 2 歳以上	1.0 g (約1/3匙)	
2 歳未満	0.75 g (約1/4匙)以下	

〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させること。

〔成分及び分量〕 1 日量(9.0 g)中

白虎加桂枝湯水製乾燥エキス	4.80 g
〔日本薬局方 セッコウ	15.0 g〕
〔日本薬局方外 粳米	8.0 g〕
〔日本薬局方 チモ	5.0 g〕
〔日本薬局方 ケイヒ	4.0 g〕
〔日本薬局方 カンゾウ	2.0 g〕

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

- 本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10
電話：03-3973-2917
○受付時間：9:00～17:00
(土、日、祝祭日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931

発売元 **一元製薬株式会社**
東京都豊島区要町3-4-10
製造販売元 **株式会社 カ ー ヤ**
(輸入元) 大阪府吹田市垂水町3-4-11