

漢方薬 白虎加人参湯「タキザワ」

17K

△<使用上の注意>

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - 胃腸虚弱で冷え症の人
 - 高齢者
 - 次の症状のある人
むくみ
 - 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

チ モ……………5.0g コウベイ……………8.0g
セ ッ コウ……………15.0g ニンジン……………3.0g
カ ン ソ ウ……………2.0g
1日分(1包16.5g×2) 33.0g

【効能・効果】

体力中等度以上で、熱感と口渇が強いものの次の諸症：
のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全量
15歳未満7歳以上	大人の2/3
7歳未満4歳以上	大人の1/2
4歳未満2歳以上	大人の1/3
2歳未満	大人の1/4

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180261



製造販売元
株式会社 タキザワ漢方薬
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室 ☎048-688-7923
受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎0120-149-931

