

(*)：2005年11月に追記しました。

この説明書は、本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

ソーピレイP

医薬品

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎(*)	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

〔効能・効果〕

色白で疲れやすく汗のかきやすい傾向のある次の諸症
肥胖症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ

〔用法・用量〕

次の1回量を、1日3回食前又は食間(注)に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量
成人 (15歳以上)	4錠宛
15歳未満 7歳以上	3錠宛
7歳未満 5歳以上	2錠宛
5歳未満	服用しないこと

(注) 食間とは、食後2～3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

※裏面もお読みください。

〔成分・分量〕

1 日量(12錠)中

ポ ウ イ	2.5 g
オ ウ キ	2.5 g
ビヤクジュツ	1.5 g
タ イ ソ ウ	1.5 g
カ ン ソ ウ	0.75g
ショウキョウ	0.5 g

上記生薬より得た防己黄耆湯エキス1300mgを含む。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、カルボキシメチルセルロースカルシウム、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、水酸化アルミナ・マグネシウム、乳糖を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は天然の生薬を原料にした生薬エキスを用いていますので、原料により錠剤の色が多少異なることもあります。尚、吸湿した場合にも錠剤の色が濃くなることもあります。

お問い合わせ先

株式会社タキザワ漢方廠 お客様相談室

☎048-688-7923 受付時間9:00～18:00(土・日・祝日を除く)



製造販売元
株式会社 **タキザワ漢方廠**
さいたま市見沼区片柳412-1