

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

漢方薬

第2類医薬品

ワクナガ 補中益気湯 エキス顆粒

ホチュウエツキトウ

製品の特徴

補中益気湯は、中国元時代に著された「ないがいしょうへんむくろん内外傷弁惑論」に収載されている漢方処方で、元気がなくて、胃腸が弱く、疲れやすい場合の、虚弱体質、疲労倦怠、病後の衰弱、食欲不振、ねあせに用いられます。

ワクナガ補中益気湯エキス顆粒は、補中益気湯をエキス化し、服用しやすい顆粒にした製品です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないで下さい。

生後3カ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人 むくみ
 - 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴ない、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝機能障害	全身のたるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1カ月位服用しても症状がよくなる場合

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。

効能・効果

元気がなく胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいもの次の諸症：
虚弱体質、疲労倦怠、病後の衰弱、食欲不振、ねあせ

用法・用量

1 回下記量を食前又は食間に水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人 (15才以上)	1 包	3 回
7才以上15才未満	2/3 包	
4才以上7才未満	1/2 包	
2才以上4才未満	1/3 包	
2才未満	1/4 包	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間くらいたったところで服用して下さい。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

成分・分量 (3包 (7.5g) 中)

補中益気湯エキス	5,000mg		
オウギ	4.0g	ニンジン	4.0g
トウキ	3.0g	チンピ	2.0g
カンゾウ	1.5g	サイコ	1.0g
カンキョウ	0.5g	ジャクジュツ	4.0g
		タイソウ	2.0g
		ショウマ	0.5g

添加物として、乳糖、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えしないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがあります。が、効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

(03) 3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/