

麻黄湯エキス顆粒KM(分包)

漢方製剤 満量処方 さむけ・発熱・ふしぶしの痛みのあるかぜに

- 麻黄湯エキス顆粒KM(分包)は、漢方薬・麻黄湯のエキスをのみやすい顆粒剤としたものです。
- 麻黄湯は中国の医学書の古典『傷寒論』に記載されている漢方処方で、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱・頭痛があり、体のふしぶしが痛い場合の感冒、鼻かぜにすぐれた効きめをあらわします。
- 眠くなる成分は含んでいません。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 次の人は服用しないでください
(1)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
(2)生後3ヵ月未満の乳児。
- ② 短期間の服用にとどめ、連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)胃腸の弱い人。
(4)発汗傾向の著しい人。
(5)高齢者。
(6)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
(8)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2)5~6回服用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：
感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

用法・用量

次の1回量を1日3回食間に服用します。

年齢	成人(15才以上)	7才～14才	4才～6才	2才～3才	2才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。

成分

3包(成人1日量：7.5g)中

麻黄湯水製乾燥エキス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.75g

マオウ	5.0g
キョウニン	5.0g
ケイヒ	4.0g
カンゾウ	1.5g
上記生薬より抽出したエキス	

添加物として、乳糖、ステアリン酸Mgを含有します。

- 本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お問い合わせ先
お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)



発売元
エスエス製薬株式会社
〒103-8431 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>

製造販売元
株式会社カヤ
大阪府吹田市垂水町3-4-11

製造元
天津泰達薬業有限公司
中国 天津市