

ま きょうかんせきとう  
**サンワ 麻杏甘石湯 エキス細粒「分包」**

サンワ麻杏甘石湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「麻杏甘石湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



**使用上の注意**



**相談すること**

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

**3. 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

**4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

**用法・用量**

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～ 6才	1/2 包
2才～ 3才	1/3 包
2才 未 満	服用しないこと

**〈用法・用量に関連する注意〉**

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

**成 分**

本品1日量 …… 3包（1包 2g）中  
麻杏甘石湯水製エキス …… 1.8g

マ オ ウ ……	3.2g
キ ョ ウ ニ ン ……	3.2g
カ ン ズ ウ ……	1.6g
セ ッ コ ウ ……	8.0g
上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

● **お問い合わせ先**

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

\*消費者くすり相談室 TEL 0570-095770  
10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

**適応症**

体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症：

せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み



**三 和 生 薬 株 式 会 社**  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1