

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの漢方製剤

ウチダの 麻杏甘石湯

マキョウカンセキトウ

ウチダの麻杏甘石湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異な芳香があります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)で軟便下痢になりやすい人。

* (4) 胃腸の弱い人。

* (5) 発汗傾向の著しい人。

(6) 高齢者。

* (7) 次の症状のある人。

むくみ、排尿困難

* (8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成分・分量

本品1袋中	
マ オ ウ	4.0g
キ ョ ウ ニ ン	4.0g
カ ン ゾ ウ	2.0g
セ ッ コ ウ	10.0g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

効能・効果

小児ぜんそく、気管支ぜんそく

用法・用量

年齢	1日量
大人(15才以上)	1袋(1日分)につき水600mLを加え、あまり強くない火にかけ300mLに煮つめ、袋をとり出し、3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15才未満7才以上	大人の煎液の2/3量を3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
7才未満4才以上	大人の煎液の1/2量を3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
4才未満2才以上	大人の煎液の1/3量を3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
2才未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8