

漢方製剤

# 神農麻杏薏甘湯エキス錠

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状              |
|------|------------------|
| 消化器  | 悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称     | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

#### 3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください

## 〔成分・分量〕

9錠中

麻杏薏甘湯乾燥エキス 1.80g を含有しています。

|         |       |         |       |
|---------|-------|---------|-------|
| 日局マオウ   | 3.00g | 日局キョウニン | 2.25g |
| 日局ヨクイニン | 7.50g | 日局カンソウ  | 1.50g |

上記生薬量に相当します

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸A1、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

## 〔効 能〕

関節痛、神経痛、筋肉痛

## 〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

| 年 齢          | 1 回量    | 1 日服用回数 |
|--------------|---------|---------|
| 大人（15 歳以上）   | 3 錠     | 3 回     |
| 7 歳以上 15 歳未満 | 2 錠     |         |
| 5 歳以上 7 歳未満  | 1 錠     |         |
| 5 歳未満        | 服用しないこと |         |

食間とは…  
食後 2～3 時間を指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5) 本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を用いた製品ですので、製品により色調等が異なることがあります。効能にはかわりありません。
- (6) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

### 神農製薬 お客様相談室

電 話 045 (593) 5738

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

## 神農製薬株式会社

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台 196-1