

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

全薬養生漢方

りょうけいじゅつかんとう

苓桂朮甘湯エキス〔細粒〕63 <漢方製剤>

第2類医薬品

苓桂朮甘湯エキス〔細粒〕63は、

- めまい、耳鳴り、頭痛を改善する漢方薬です。
- サラッとして服用しやすい淡褐色の細粒剤です。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。むくみ
 - 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：

めまい、耳鳴り、頭痛、立ちくらみ、神経症、神経過敏、動悸、息切れ

【用法・用量】

次の量を食前又は食間*に服用してください。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|------|--------|
| 大人(15才以上) | 1包 | 3回 |
| 7才以上 15才未満 | 2/3包 | |
| 4才以上 7才未満 | 1/2包 | |
| 2才以上 4才未満 | 1/3包 | |
| 2才未満 | 1/4包 | |

[※食間:「食事と食事の間」という意味で、食後2～3時間を指します。]

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。
- (3)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成 分】 (3包6.0g中)

苓桂朮甘湯エキス(1/2量)・・・2.5g

| | |
|--------|------|
| ブクリョウ | 3.0g |
| ケイヒ | 2.0g |
| ビャクジュツ | 1.5g |
| カンゾウ | 1.0g |

より抽出。

添加物として乳糖、バレイシヨデンブ、メタケイ酸アルミン酸Mg、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
 - (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
 - (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
 - (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
- 本剤は天然物を原料としていますので、製品により若干色調が異なる場合がありますが、効果には変わりありません。

問い合わせ先

1)お買い求めのお店

2)全薬工業お客様相談室

住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15

電 話：03 (3946) 3610

受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)



発 売 元
全薬工業株式会社
東京都文京区大塚5-6-15



製造販売元
松浦薬業株式会社
名古屋市長区大高町寅新田36