

●成分・分量●本品6.0gは

ブクリョウ	3.0g
ケイヒ	2.0g
ピャクジュツ	1.5g
カンゾウ	1.0g

上記より製した苓桂朮甘湯エキス(1/2量)2.5g(乾燥物換算で約1.0gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖、パレイショデンプン、香料を含有します。

●効能・効果●

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症:

立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏



ボトル、キャップ
中栓、外装フィルム

500g

4 987457 100766

製造販売元
松浦薬業株式会社
名古屋市緑区大高町寅新田36

●用法・用量●

大人(15才以上)	1回	2.0g
15才未満7才以上	1回	1.3g
7才未満4才以上	1回	1.0g
4才未満2才以上	1回	0.7g
2才未満	1回	0.5g以下

1日3回、食前又は食間に服用してください。
用時添付のサジを使用してください。
(サジー1杯は0.5gです。)

[用法・用量に関する注意]

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

[副作用被害救済制度]

☎ 0120-149-931

漢方専門 一心堂薬局

りょう けい じゅつ かん とう 苓桂朮甘湯エキス (細粒)63

第2類医薬品



発売元
一心堂漢方株式会社
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-80アコルト大野1階
TEL 048-648-2014

●使用上の注意●

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人服用しないでください。 生後3ヶ月未満の乳児
相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 医師の治療を受けている人
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - むくみのある人
 - 高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●保管及び取扱い上の注意●

- 直射日光の当たらない、温気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります
が、効果には変わりありません。