

漢方薬 オオクサ六味丸

オオクサ六味丸（分包）

特 徴

- オオクサ六味丸は漢方薬「六味丸」（ろくみがん）の処方により、6種類の生薬末をハチミツで練り合わせた丸剤です。
- 疲れやすく腰から下に力の抜けた感じがあり、夜オシッコに起きる回数が多くなったという方に良く効きます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|---------------|
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

効 能

体力中等度以下で、疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渇があるものの次の諸症：

排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ



排尿困難



頻尿



むくみ

用法・用量

次の量を、食前又は食間に、水またはお湯でかまずに服用してください。

| 年 齢 | 1 回量 | 1 日服用回数 |
|------------|------------|---------|
| 成人（15歳以上） | 25丸（1包） | 3回 |
| 7歳以上15歳未満 | 16丸（約2/3包） | |
| 4歳以上 7 歳未満 | 12丸（約1/2包） | |
| 4歳未満 | 服用しないでください | |

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人の1日服用量75丸（3包）中

| 成 分 | 含 量 |
|--------------|---------|
| ジ オ ウ（地 黄） | 1760 mg |
| サンシュユ（山茱萸） | 880 mg |
| サンヤク（山 薬） | 880 mg |
| タクシャ（沢 瀉） | 660 mg |
| ブクリョウ（茯 苓） | 660 mg |
| ポ タ ン ピ（牡丹皮） | 660 mg |

添加物として寒梅粉，ハチミツ，セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。



お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：03(3370)7174（代表）

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

(独)医薬品医療機器総合機構
副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15