



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第②類医薬品

「モリ」シンニヨウ錠

特徴

「モリ」シンニヨウ錠は、当帰、木通など成分欄記載の14種類の生薬で構成される和漢薬の、のみやすいエキス糖衣錠です。本剤の服用で、尿が出にくい、むくみ、下腹部の痛みなど不快な症状が改善され、膀胱カタルなど効能欄記載の腎・膀胱・泌尿器系の病気に効きめがあります。



使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く、下痢しやすい人。
 - (4) 発汗傾向の著しい人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、食欲不振、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

膀胱カタル、尿道炎、腎臓病、ネフローゼ、水腫

用法及び用量

次の量を朝夕空腹時に、水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（16歳以上）	3～6錠	2回
15歳以下8歳以上	2～3錠	

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

本剤6錠（2.4g）中、下記生薬の水製乾燥エキス1.2gが含まれています。

ジオウ（地黄）	2.5g	サンシシ（山梔子）	0.75g
トウキ（当帰）	2.5g	リュウタン（竜胆）	0.75g
モクツウ（木通）	2.5g	ケイヒ（桂皮）	0.1g
オウゴン（黄芩）	1.5g	ショウキョウ（生姜）	0.1g
シャゼンシ（車前子）	1.5g	ダイオウ（大黃）	0.1g
タクシャ（沢瀉）	1.5g	マオウ（麻黄）	0.1g
カンゾウ（甘草）	0.75g	レンギョウ（連翹）	0.1g

添加物として、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、カルナウバロウを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室

〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

電話 (06) 6629-0062

受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)