

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

生薬製剤

EX.エツピカジュツトウシール

(越 婢 加 朮 湯)

エツ ビ ガ ジュツ トウ

特 徴

- 「越婢加朮湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「キンキョウリヤク金匱要略」に収載されている薬方です。「越婢湯」に朮を加えたもので、浮腫がひどく、尿量が減少し、関節が痛むものなどに用いられます。
- 「EX.エツピカジュツトウシール」は、「越婢加朮湯」を散剤としたもので口が渇き、浮腫があり、尿量が減少する方の関節炎、湿疹などに用いられます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）で軟便下痢になりやすい人
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

*効 能

体力中等度あるいはそれ以上で浮腫（むくみ）があり、口が渇き、汗が出て、尿量が減少する傾向にあるものの次の諸症：浮腫（むくみ）、関節痛、関節炎、湿疹、夜尿症、目のかゆみ・痛み



関節痛



むくみ

(裏面につづきます)

用法・用量

次の量を1日3回食間又は空腹時に温湯で服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

成分

成人1日の服用量3包(1包1g)中、次の成分を含んでいます。

水製エキス ……………1,000mg
〔マオウ3.6g、セッコウ12.0g、ショウキョウ0.8g、タイソウ2.4g、カンゾウ0.4g、ビャクジュツ2.0gより抽出。〕
カンゾウ末……………600mg

添加物として、バレイシヨデンブンを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキス等を用いていますので、製剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。



健康アドバイス

- 水分のとりすぎ、濃い味を控えましょう



「飲みすぎ、食べすぎ」に気をつけ、さまざまな食材を少しずつとるように心がけましょう。特に、お酒の飲みすぎに注意し、味の濃いもの、カロリーの高いこってりした料理を食べすぎないことが大切です。

- 適度な運動を心がけましょう



朝夕の散歩や軽い体操など、自分でできる範囲内で体を動かすことが大切です。体を動かして汗を流すことは、筋肉や関節を強くするだけでなく、体の掃除にもつながります。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎(03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **松浦薬業株式会社**
名古屋市緑区大高町寅新田36 (〒459-8001)