

平成25年2月改訂

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

本品は古くから民間薬として用いられてきた防己（オオツツラフジ）、松藤、木天蓼（マタタビ）、接骨木（ニワトコ）、血行を良くする当帰などを配合した煎じ薬です。煎じて服用ください。

⚠ 使用上の注意

❌【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

🗨️【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|-------|---------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 |
| 精神神経系 | めまい |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の治療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|--------------------|---|
| 偽アルドステロン症 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 1週間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

神経痛、坐骨神経痛、顔面神経痛、三叉神経痛、腰痛、肋間神経痛、ロイマチスに用いて利尿及び便通をよくし胎毒を去る効あり

用法・用量

1包を水3合に浸し2合に煎じ詰め朝昼食前2回服用し、後水2合を加えて1合に煎じ詰め夕食前服用する。

| 年齢 | 服用量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 大人 | 全量 | 3回 |
| 15歳以下8歳まで | 半量 | |
| 8歳未満 | 服用しないでください | |

成分・分量（1日量：1包18.75g中）

| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
|---------|-------|--------|-------|
| ボウイ | 3.80g | セッコツボク | 1.00g |
| センキュウ | 3.75g | ダイオウ | 1.00g |
| トウキ | 1.00g | センナ | 1.00g |
| マツフジ | 1.80g | カンゾウ | 1.80g |
| モクテンリョウ | 1.80g | サンキライ | 1.80g |

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わる為）。

◎つくった煎液及びはじめに煎じた後の湿潤した葉は変質したり、腐敗しやすいのでフタをするなどして涼しい所に、他の飲物等と区別して保管してください。

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。
電話：(076) 431-7017 FAX：(076) 431-7013
受付時間：午前9時から午後4時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元：株式会社 延寿堂
〒930-0813 富山市下赤江町1-13-3



内袋：PP
外袋：PE,PA

第②類医薬品

延寿神経痛リウマチス湯

神経痛・坐骨神経痛・顔面神経痛

池田屋安兵衛商店

成分・分量(1日量:1包18.75g中)

| | | | |
|---------|-------|--------|-------|
| ボウイ | 3.80g | セッコツボク | 1.00g |
| センキュウ | 3.75g | ダイオウ | 1.00g |
| トウキ | 1.00g | センナ | 1.00g |
| マツフジ | 1.80g | カンゾウ | 1.80g |
| モクデンリョウ | 1.80g | サンキライ | 1.80g |

〈用法・用量〉

大人は1日1包を3回毎食前服用する。15歳以下8歳までは半量とする。
1包を水3合に浸し2合に煎じ詰め朝昼2回に服用し、後水2合を加えて1合に煎じ詰め夕食前服用する

〈効能・効果〉

神経痛、坐骨神経痛、顔面神経痛、三叉神経痛、腰痛、肋間神経痛、ロイマチスに用いて利尿及び便通をよくし胎毒を去る効あり

〈注 意〉

- 1.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 2.服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 3.服用に際しては説明文書をよく読んでください。
- 4.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

●脱酸素剤がいられてありますので、煎じるときに誤って入れないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

発売元 株式会社 池田屋安兵衛商店
〒930-0046 富山県富山市堤町通り1-3-5
電話(076)425-1871

製造販売元 株式会社 延寿堂
〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3

3包入(3日分)



4 957492 000505

第②類医薬品

神経痛・坐骨神経痛・顔面神経痛

延寿神経痛

リウマチス湯

