

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

# 強力蘇命湯

第②類医薬品

(30日分)  
20.0g×30袋

生薬処方 of 糖尿病薬

10種類の自然生薬を配合した再春館独自の処方

## ⚠️ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 授乳中の人
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
  - 胃腸の弱い人
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - 高齢者及び15歳以下の小児
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人 むくみ
  - 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
  - 薬（特に医師、歯科医師から処方された医薬品）を使用している人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3ヶ月くらい服用しても症状の改善が見られない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


## ■ 効能又は効果


糖尿病及び糖尿病による次の諸症に効がある。  
口渇・尿量過多・疲労倦怠。

## ■ 用法及び用量

大人は1袋につき(1日分)水500mLをもって煎じつめ約半量となしたのち滓をこして取り去り、食前3回に分服してください。15歳以下は大人の半量を服用してください。

### 強力蘇命湯 チャック式密封袋の開け方と煎じ方

- 

1 矢印(△部分)からお開けください。開封後はチャックをご利用ください。
- 

2 やかんの中に水500mLと煎じ袋ひと袋(1日分)を入れてください。
- 3 吹きこぼれに注意し、沸騰させてから弱火で水の量がおよそ半分(250mL)になるまで煎じます。
- 4 煎じ終わったら袋を取り出し毎食前(朝、昼、夕)に1/3ずつご服用ください。15歳以下は大人の半量服用。

### <用法及び用量に関連する注意>

定められた用法及び用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

※本剤は必ず1日分ずつ煎じてください。

## ■ 成分及び分量

1袋 (20.0g) 中

カロコン……………3.0g	カンゾウ……………1.0g	キジツ……………1.0g
チモ……………2.0g	ニンジン……………1.0g	バクモンドウ……………2.0g
ブクリョウ……………3.0g	イチイ……………1.0g	ジオウ……………3.0g
レンセンソウ…3.0g		

### <成分及び分量に関連する注意>

本剤は生薬(薬用の草根木皮)を用いた製品ですので、製品により色、におい、形状または味(苦み、渋み等)が多少異なる場合がございます。又、分包紙の内側に原料のジオウに含まれる成分が付着し、黒色あるいは茶色に着色することがございますが、いずれの場合も製品の品質には影響ありません。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
4. 煎じ液は冷暗所又は冷蔵庫に保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### ご相談及びお問い合わせ

1. 本品についてのお問い合わせは下記のフリーダイヤルへご連絡ください。  
(1)お電話でのお問い合わせ(午前8時から午後10時まで受付)  
☎ TEL 0120-305-305  
(2)FAXでのお問い合わせ(24時間受付)  
☎ FAX 0120-444-104
2. 当社では薬剤師又は登録販売者が常駐しておりますので、ご相談ください。

製造販売元



株式会社 再春館製薬所

熊本県上益城郡益城町寺中1363-1