

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感
その他	異常出血

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

<保管及び取扱い上の注意> 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。2. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。) 4. 湿気などにより薬が変質することがありますので、次のことに注意して下さい。1) 服用のつどフタを固く締めて下さい。2) めれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないで下さい。5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

血府逐瘀

顆粒

500g

医林改錯・王清任

血府逐瘀顆粒[®] 第2類医薬品

- 効能・効果 中年以降又は高血圧傾向のあるものの次の諸症：頭痛、頭重、肩こり、のぼせ、動悸
- 用法・用量 次の量を水又は白湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2.5g	3回
15歳未満	服用しないこと	

添付の匙8分目で約1回量です。

- 成分 成人1日の服用量7.5g中に下記成分及び分量を含んでいます。

血府逐瘀丸料エキス末 3.0g

トウキ 1.98g	トウニン 2.64g	シャクヤク 1.32g	キキョウ 0.99g
センキュウ 0.99g	コウカ 1.98g	サイコ 0.66g	ゴシツ 1.98g
ジオウ 1.98g	キジツ 1.32g	カンゾウ 0.66g	

血府逐瘀湯末 1.5g

トウキ 0.18g	トウニン 0.24g	シャクヤク 0.12g	キキョウ 0.09g
センキュウ 0.09g	コウカ 0.18g	サイコ 0.06g	ゴシツ 0.18g
ジオウ 0.18g	キジツ 0.12g	カンゾウ 0.06g	

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

<成分に関連する注意>本剤は天然物(生薬)を用いていますので、顆粒の色や味が多少異なることがあります。

八ッ目製薬株式会社  容器、キャップ
東京都江戸川区船堀 2-14-14 フィルム、スプーン

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせ致します。 使用期限
八ッ目製薬株式会社 (お客様相談室) 製造番号
電話 (03) 3680-0005
受付時間 9:00~17:00 (土・日、祝日を除く)



4 992402 107639