

【糖尿病用生薬製剤】

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

ダイアベトン®

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の医薬品を服用している人。

血糖降下剤

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

糖尿病、血糖増加による口渇^{a)}

^{a)} 口渇：口のかわきのことを示します。

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量 3包(3g)中

オウレン	0.225g	・ カッコ	0.375g	・ カロコ	1.5g
カンゾウ	0.15g	・ ゴミシ	0.75g	・ ジオウ	1.5g
トウキ	0.75g	・ ニンジン	0.075g	・ バクモンドウ	1.5g
ブクリョウ	0.375g				

} エキス・・・0.75g

オウレン末・・・0.15g、カンゾウ末・・・0.75g、ニンジン末・・・0.375g、ブクリョウ末・・・0.975g

- ・ 本剤は淡褐色で、特異なおいを有し、味は極めて苦い散剤です。
- ・ 本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

ダイアベトン[®]は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

株式会社 ウチダ和漢薬

電話 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

発売元

 株式会社 ウチダ和漢薬

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-2-8

製造販売元

 剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号