

生薬製剤

赤本印 ヨクイニン末

第3類医薬品

(日本薬局方 ヨクイニン末)



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕 いぼ、皮膚のあれ

〔用法・用量〕 大人(15才以上)は1回2g、1日3回食前又は食間に服用する。添付のスプーン1匙は1gです。
*定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量〕 本品1日量6g中 日本薬局方ヨクイニン末6g

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ツク ダ サン ジュ エン シャ
株式会社 築田三樹園社

広島市中区東白島町21-21
TEL (082) 221-3603



スプーン: PP
スプーン袋: PE
袋: PE

