

おおばこ

第2類医薬品

成分・分量

1日量1包(5g)中、次の成分を含有する。

成分	1日量1包(5g)中
日本薬局方シャゼンソウ	5g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないこと。

内 容 量

5g×24包(120g)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室
〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地
電 話：052-892-1287(代表)
受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電 話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本草製薬株式会社
名古屋市天白区古川町125番地



03

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

咳止め薬 本草シャゼンソウ(分包)5 日本薬局方 シャゼンソウ

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

せき

用法・用量

大人(15歳以上)は、1日量1包(5g)を水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ^{かす}滓をこして取り去り1日3回食前または食間に分服する。
15歳未満の小児は服用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

煎じ方

水約600mLの中へ1包を入れ、軽く泡立つ程度の弱火で約400mL(10～15分)に煎じて火を止め、袋を取り出してください。

この約400mLを1日3回食前または食間に分けて服用してください。

