

第2類医薬品

外用殺菌消毒剤

日本薬局方

クレゾール石ケン液

Saponated Cresol Solution
販売名 クレゾール石ケン液「タイセイ」P

500mL

発売元  **中北薬品株式会社**
愛知県津島市白浜町字番場52-1

製造販売元 **大成薬品工業株式会社**
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

A

2015年4月作成（第1版）

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読み下さい

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる〕

1. 原液では使用せず、必ず薄めて使用すること。
2. 次の部位には使用しないこと。
目、目のまわり、口、唇等には使用しないこと。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 3) 患部が広範囲の人。
 - 4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

手指・創傷面の殺菌・消毒
便所、便器、ごみ箱、たんづば、浄化そう等、疾病の予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

用法・用量

- 次のように水で希釈して洗浄する。
1. 手指の消毒の場合：2%（本剤の50倍液）
 2. 創傷面の殺菌の場合：1%（本剤の100倍液）
 3. 便所等の消毒の場合：3%（本剤の33倍液）

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 外用にのみ使用し、内服しないこと。
3. 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
4. 本品は、使用濃度においてもクレゾール臭を有するので、適用箇所に十分注意すること。また、クレゾール臭を長時間吸わないように注意すること。
5. 本剤は水道水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には、上澄み液を使用すること。

<希釈方法>

- 33倍液：本剤を30mLとり、水1Lにうすめる。
50倍液：本剤を20mLとり、水1Lにうすめる。
100倍液：本剤を10mLとり、水1Lにうすめる。

使用期限

製造番号

成分・分量

本品は、クレゾール42～52vol%を含む。
添加物としてナタネ油、水酸化カリウムを含む。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
2. 小児の手が届かないところに保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。（誤用の原因になったり、品質が変わる）
4. 原液が皮膚に付着した場合は、刺激症状を起こすので、ただちに石けん水と水で洗い流すこと。また、刺激症状（炎症）が起きた場合は医師の診療を受けること。（原液を取扱う場合は、保護メガネ、ゴム手袋等を着用すること。）

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、あるいは下記にお願いします。
中北薬品株式会社 製薬工場事業部
電話 0567-32-1431
受付時間：9時から17時まで
（土 日 祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

 外装フィルム
ガラス：瓶
金属：キャップ



4 987333 021758