複方ヨード・グリセリン「東豊」

日本薬局方 **複方ヨード・グリセリン**

Compound Iodine Glycerin

500 mL

製造販売元
東豊薬品株式会社
東京都葛飾区西新小岩４－15－３

2008年７月改訂(第６版)
(販売名併記、新コード併記)
2005年４月改訂(第５版)
(薬事法改正による表示変更)

日本標準商品分類番号	87279

承認番号	16000AMZ05477
薬価収載	2008年７月
販売開始	1955年９月
再評価結果	1982年８月

【貯　　法】：しゃ光、気密容器
【使用期限】：製造の翌月から３年

口 腔 用 剤

【禁　忌】：(次の患者には使用しないこと)：
本剤又はヨウ素に対して過敏症の既往歴のある患者。

【組成・性状】：
組　　成：１mL中　ヨ　ウ　素　12mg
グ リ セ リ ン　900μL
液状フェノール　5μL
添加物としてヨウ化カリウム、ハッカ水を含む。
性　　状：本品は赤かっ色粘稠の液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】：咽頭炎・喉頭炎・扁桃炎

【用法・用量】：症状に応じ、適宜適量を患部に塗布する。

【使用上の注意】：

1. **相互作用**
併用禁忌（併用しないこと。）

薬剤名	機 序 ・ 危 険 因 子
水銀剤	ヨ ウ 化 水 銀 発 生

2. **副作用**：本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) **重大な副作用**
アナフィラキシー様症状：他のヨード製剤において、まれにアナフィラキシー様症状（呼吸困難、潮紅、蕁麻疹等）があらわれることがあるとの報告があるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

(2) **その他の副作用**

	頻　度　不　明
甲 状 腺	本剤及び他のヨード製剤において、血中甲状腺ホルモン値(T_3,T_4等)の上昇あるいは低下など甲状腺機能異常があらわれることがあるとの報告がある。
過 敏 症	発疹、口腔粘膜び爛等

注）このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. **妊婦・産婦・授乳婦等への投与**：
他のヨード製剤において、先天性甲状腺機能低下症の乳児の報告があるので妊娠中および授乳中の婦人には、長期にわたる広範囲の使用をさけること。

製造番号：

使用期限：

GS1-RSS

JAN

(01)14987429001558

4 987429 001558

キャップ：PP
パッキン：PE
ガラス：瓶