

プリビシー液0.05%

プリビシー液0.05%

プリビシー液0.05%

貯法：室温保存
使用期限：ラベルに表示の使用期限内に使用すること。
使用時及び保管：取扱上の注意の項参照

【薬効薬理】

ベンザルコニウム塩化物は、グラム陽性、陰性菌のみならず、芽胞のない細菌やカビ類といった真菌類に対しても殺菌作用を有する。しかし、結核菌及び大部分のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ベンザルコニウム塩化物
(Benzalkonium Chloride)

性状：白色～黄白色の粉末又は無色～淡黄色のゼラチン状の薄片、ゼリー様の流動体若しくは塊で、特異なにおいがある。
水又はエタノール(95)に極めて溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。水溶液は振ると強く泡立つ。

【取扱上の注意】

- ①皮革製品の消毒に使用すると、変質させることがあるので使用しないこと。
- ②本剤は無菌製剤のため、開封後は速やかに使用すること。

ゴムパッキン
キャップ:PP
ボトル:PP
ラベル:PS

0.05%

319-1M7

外用殺菌消毒剤 500mL 滅菌製剤

プリビシー液0.05% ベンザルコニウム塩化物液

0.05%



販売提携 大塚製薬株式会社
東京都千代田区神田司町2-9
製造販売元 株式会社大塚製薬工場
徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

プリビシー液0.05%

【組成・性状】

本剤は、100mL中にベンザルコニウム塩化物を0.05g含有する無色澄明な液で、においはなく、振ると強く泡立つ。無菌製剤である。本剤は添加物として精製水を含有する。

【効能・効果】及び【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、ベンザルコニウム塩化物0.05～0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5～10分間ブラッシングする。
腔洗浄	ベンザルコニウム塩化物0.02～0.05%溶液を用いる。
結膜囊の洗浄・消毒	ベンザルコニウム塩化物0.01～0.05%溶液を用いる。
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	ベンザルコニウム塩化物0.05～0.2%溶液を布片で塗布・清拭するか、又は噴霧する。

本剤は上記の効能・効果に対していずれも希釈することなく、そのまま使用できる。

《用法・用量に関連する使用上の注意》

- 1) 炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
- 2) 粘膜、創傷面、炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋脱力を起こすおそれがある)。

使用期限

製造番号



【使用上の注意】

- (1) 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
過敏症(頻度不明):発疹、痒痒感等があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止し、対症療法を行うこと。
- (2) 臨床検査結果に及ぼす影響
ベンザルコニウム塩化物液で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。
- (3) 適用上の注意

- 人体
1) 投与経路:経口投与しないこと。
2) 使用部位:密封包帯、ギプス包帯、パッドに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。

- その他
使用時
①血清、膿汁は殺菌作用を弱めるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。
②石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。
③消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。
④繊維、布(綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等)は、ベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下にならないように新しい溶液を補給すること。
⑤合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。

0.05%