

滅菌製剤 0.5%

開封日 年 月 日

滅菌製剤 0.5%

ステリクワン®W液0.5

ステリクワン®W液0.5

0.5

※※2017年10月改訂(第5版)  
※ 2016年6月改訂  
日本標準商品分類番号 872619

ステリクワン®W液0.5

0.5

承認番号(4AM)1233  
薬価収載 1994年7月  
販売開始 1993年2月  
再評価結果 1992年6月

- (左側面より続く)
- (3)調製方法:  
綿球・ガーゼ等は、本剤を吸着するので、これらを希釈溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。
- (4)器具等材質:  
器具類の消毒に使用する本剤の希釈水溶液には、必要に応じ防錆剤として亜硝酸ナトリウムを1g/L添加する。
5. その他の注意  
クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起した患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

〔取扱以上の注意〕  
〔注意〕

- (1)希釈水溶液を調製する場合は、滅菌精製水を使用して滅菌することが望ましい。(高圧蒸気滅菌を行う場合は115℃30分、121℃20分、126℃15分で滅菌処理できる。)
- (2)本剤の付着した白布を直接、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミを生じることがあるので、漂白剤としては過酸化ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。
- (3)開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けること。

登録商標

外用殺菌消毒剤

滅菌製剤

ステリクワン®W液0.5



貯法: 気密容器  
避光して  
室温保存  
注意: 「取扱以上の注意」の項参照

健栄製薬株式会社  
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

ステリクワン®W液0.5

- ※〔組成・性状〕  
〔組成〕100 mL中  
クロルヘキシジングルコン酸塩0.5g含有(0.5w/v%)。  
※〔性状〕  
無色～微黄色の澄明な液で、においはない。  
滅菌製剤である。

0.5%

ゴム: パッキン  
キャップ: PP  
ボトル: PP  
ラベル: PS

- ※※〔禁忌(次の患者及び部位には使用しないこと)〕  
(1)クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある患者  
(2)脳、脊髄、耳(内耳、中耳、外耳)  
〔聴神経及び中枢神経に対して直接使用した場合は、難聴、神経障害を来すことがある。〕  
※※(3)腫、膀胱、口腔等の粘膜面  
〔クロルヘキシジン製剤の上記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。〕

〔効能・効果〕〔用法・用量〕

効能・効果	用法・用量
手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒	クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1~0.5%水溶液を用いる。
皮膚の創傷部位の消毒、手術室、病室・家具・器具・物品などの消毒	クロルヘキシジングルコン酸塩として0.05%水溶液を用いる。
結膜囊の洗浄、消毒	クロルヘキシジングルコン酸塩として0.05%以下の水溶液を用いる。
産婦人科・泌尿器科における外陰、外性器の皮膚消毒	クロルヘキシジングルコン酸塩として0.02%水溶液を用いる。

〈開封前包装単位用位置用コード〉  
011111101111  
011111101111  
〈開封前包装単位用位置用コード〉

- ※※〔使用上の注意〕  
1. 慎重投与(次の患者には慎重に使用すること)  
(1)薬物過敏症の既往歴のある患者  
(2)喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある患者  
2. 重要な基本的注意  
※※(1)ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。  
(2)本剤は濃度に注意して使用すること。  
(3)結膜囊等特に敏感な組織に使用しななければならない場合には、濃度に注意し、使用後滅菌精製水で水洗すること。  
(4)本剤を希釈して使用する場合は、調製後滅菌処理すること。  
3. 副作用  
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。  
※※(1)重大な副作用  
ショック(頻度不明)、アナフィラキシー(頻度不明): ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので観察を十分にを行い、血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

頻度不明	
過敏症注)	発疹・発赤・蕁麻疹等
注) このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、再使用しないこと。	

4. 適用上の注意  
(1)投与経路: 外用にのみ使用すること。  
(2)使用時:  
1) 原液が眼に入らないように注意すること。  
眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。  
2) 注射器、カテーテル等の神経あるいは粘膜面に接触する可能性のある器具を本剤で消毒した場合は、滅菌精製水でよく洗い流した後使用する。こと。  
3) 本剤の付着したカテーテルを透析に用いると、透析液の成分により難溶性の塩を生成することがあるので、本剤で消毒したカテーテルは、滅菌精製水でよく洗い流した後使用する。こと。  
4) 血清、透析等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、濃度、消毒時間等に十分注意すること。  
5) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落してから使用すること。  
※6) 溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起したとの報告があるので、注意すること。

(右側面へ続く)

製造番号

使用期限