

代謝賦活剤

# アデホス<sup>コーワ</sup>腸溶錠20

# アデホス<sup>コーワ</sup>腸溶錠60





ADETPHOS<sup>KOWA</sup> ENTERIC COATED TABLET 20・60

(ATP腸溶錠)

貯 法:気密容器、室温保存  
開封後は湿気を避けて保存  
使用期限:外箱等に表示

	腸溶錠20	腸溶錠60
承認番号	(45AM)2758	(45AM)2934
薬価収載	1972年2月	1972年2月
販売開始	1972年2月	1972年2月
再評価結果	1999年6月	

## 組成・性状

販 売 名	アデホス <sup>コーワ</sup> 腸溶錠20	アデホス <sup>コーワ</sup> 腸溶錠60
成分・含量	1錠中 アデノシン三リン酸 二ナトリウム水和物 20.0mg	1錠中 アデノシン三リン酸 二ナトリウム水和物 60.0mg
添 加 物	セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、クエン酸トリエチル、酸化チタン、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、メタクリル酸共重合体LD、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート80、カルナウバロウ	
色調・剤形	白色・腸溶性フィルムコーティング錠	
外 形	 直径約8.3mm 厚さ約4.4mm 重量約0.22g	 直径約8.3mm 厚さ約4.4mm 重量約0.22g
識別コード		

## 効能・効果

- 下記疾患に伴う諸症状の改善  
頭部外傷後遺症
- 心不全
- 調節性眼精疲労における調節機能の安定化
- 消化管機能低下のみられる慢性胃炎

## 用法・用量

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物として、1回40～60mgを1日3回経口投与する。  
なお、症状により適宜増減する。

## 使用上の注意

### 1. 相互作用

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジピリダモール	ジピリダモールはATP分解物であるアデノシンの血中濃度を上昇させ、心臓血管に対する作用を増強するとの報告があるので、併用にあたっては患者の状態を十分に観察するなど注意すること。	ジピリダモールのアデノシン取り込み抑制作用により、ATP分解物であるアデノシンの血中濃度が上昇する。

### 2. 副作用

内服剤(腸溶錠・顆粒)における集計で、総症例1,920例中副作用が報告されたのは35例(1.82%)であり、主な症状は、胃腸障害、悪心、痒痒感などであった。

また臨床検査値には一定の変動は認められなかった。

(再評価及び顆粒の効能追加時における集計)

	1.0%未満	頻度不明
消 化 器	悪心、食欲不振、胃腸障害、便秘傾向、口内炎	
循 環 器	全身拍動感	
過 敏 症	痒痒感	発疹
精神神経系	頭痛、眠気、気分が落ち着かない	
感 覚 器	耳鳴	
そ の 他	脱力感	

### 3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

### 4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。〕

### 5. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。

### 6. 適用上の注意

#### (1)薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

#### (2)調剤時

本剤の使用にあたり乳鉢等ですりつぶさないこと。

## 臨床成績

心不全、頭部外傷後遺症、胃の下垂を伴う慢性胃炎、眼精疲労に対する二重盲検比較試験の結果、本剤の有用性が認められている。<sup>1)~4)</sup>

## 薬効薬理

1. 血管拡張作用により各種臓器組織の血流量を増加する。  
脳(イヌ、ネコ、成人男子)<sup>5)~7)</sup>、心(イヌ)<sup>8)9)</sup>、胃(イヌ)<sup>10)</sup>、内耳(モルモット)<sup>11)12)</sup>の血流量を増加する。
2. 生体内の代謝活性を増加する。  
脳(モルモット、*in vitro*)<sup>13)14)</sup>、心(イヌ、ウサギ)<sup>15)16)</sup>、内耳(モルモット、*in vitro*)<sup>17)18)</sup>などの代謝活性を増加する。
3. 筋収縮力を増強する。  
心筋(カエル、*in vitro*)<sup>19)</sup>、胃腸管平滑筋(ラット、健康人)<sup>20)21)</sup>の収縮力増強作用を有する。
4. 神経伝達の効率化をはかる。  
神経伝達の効率化をはかる(ウシ蛙、*in vitro*)<sup>22)</sup>


## 有効成分に関する理化学的知見

一般名：アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

(Adenosine Triphosphate Disodium Hydrate)

化学名：Disodium adenosine-5'-triphosphate (ATP-2Na)

構造式：



分子式：C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>N<sub>5</sub>N<sub>a2</sub>O<sub>13</sub>P<sub>3</sub> · 3H<sub>2</sub>O

分子量：605.19

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、わずかに酸味がある。水に溶けやすく、エタノール(95)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

## 包装

アデホスコーワ腸溶錠20 PTP:100錠、500錠、1000錠、2100錠  
瓶：1000錠

アデホスコーワ腸溶錠60 PTP:100錠、1000錠、2100錠  
瓶：1000錠

## 主要文献

- 1) 高崎 浩他:臨床と研究, **55**, 207(1978)
- 2) 堀 浩他:薬理と治療, **3**, 923(1975)
- 3) 三好秋馬他:薬理と治療, **3**, 950(1975)
- 4) 鈴木昭弘他:薬理と治療, **3**, 933(1975)
- 5) 松本 皓他:臨床と研究, **50**, 1510(1973)
- 6) 寺田秀興他:脳と神経, **28**, 151(1976)
- 7) 後藤和彦他:基礎と臨床, **16**, 3617(1982)
- 8) 小金沢清美:日大医学雑誌, **19**, 3513(1960)
- 9) 大島研三他:呼吸と循環, **7**, 115(1959)
- 10) 岡田益雄他:薬理と治療, **6**, 3553(1978)
- 11) 吉田萬子他:耳鼻と臨床, **29**, 63(1983)
- 12) 秋吉正豊他:Audiology Japan, **25**, 614(1982)
- 13) 村松 文雄:精神神経学雑誌, **61**, 764(1958)
- 14) 相沢豊三他:内科, **1**, 1133(1958)
- 15) 伊藤 友衛:ビタミン, **17**, 331(1959)
- 16) 小林宏行他:薬理と治療, **3**, 900(1975)
- 17) 中野 雄一:耳鼻咽喉科臨床, **54**, 860(1961)
- 18) 小出 靖他:耳鼻咽喉科臨床, **57**, 149(1964)
- 19) 草場 正:久留米医学会誌, **33**, 1652(1970)

20) 中山 修他:薬理と治療, **6**, 3559(1978)

21) 山形敏一他:ATPの基礎と臨床, **4**, 88(1963)

22) 平井恵二他:医学のあゆみ, **122**, 635(1982)

## \*文献請求先及び問い合わせ先

興和株式会社 くすり相談センター

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

電話 0120-508-514

03-3279-7587

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)